

# **CONTENIDO DE MERCURIO EN HUESOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y TRASHUMANCIA**

por

**E. Logemann\*, G. Kalkbrenner\*\*, B. Krützfeldt\*\*\* y W. Schüle\*\***

**Resumen:** La evolución de los sistemas prehistóricos de producción animal en la Península Ibérica es poco conocida. Sobre todo la cuestión de la trashumancia prehistórica queda abierta. Suponemos que mercurio, un elemento muy concentrado en los suelos de la zona de Almadén, ha sido asimilado por animales que pastearon por allí. El contenido de mercurio en huesos de ganado bovino y ovino/caprino, procedentes de diferentes excavaciones arqueológicas, está analizado y interpretado.

**Palabras-clave:** Ganadería prehistórica. Trashumancia. Mercurio.

**Abstract:** The evolution of prehistoric animal production systems in the Iberian Peninsula is little understood. Particularly the question of prehistoric transhumance is still open. It is assumed that mercury, which is highly concentrated in the soil of the Almadén region, was absorbed by animals grazing there. The mercury content of cattle and sheep/goat bones from different archaeological excavations is analyzed and interpreted.

**Key-Words:** Prehistoric livestock raising. Transhumance. Mercury.

## **PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL**

### **El problema histórico-árqueológico: ¿cómo se crió el ganado en tiempos pre-medievales?**

Desde la Alta Edad Media la forma predominante de la ganadería ovina y bovina en la Península Ibérica era la trashumancia (KLEIN 1920; GARCIA MARTIN & SANCHEZ BENITO 1986). La trashumancia es un fenómeno muy

\* Institut für Rechtsmedizin der Universität Freiburg/Brsg., Albertstraße 9, D-79104 Freiburg/Brsg., Germany.

\*\* Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Freiburg/Brsg., Belfortstraße 22, D-79098 Freiburg/Brsg., Germany.

\*\*\* GFU, Gesellschaft für Umweltanalytik, Castellbergstraße 5, D-79282 Ballrechten-Dottingen, Germany.

## **Una posible solución: la huella del mercurio**

Para resolver este problema dirigimos nuestra atención hacia los animales prehistóricos mismos:

Una de las zonas más importantes de pasto invernal es el Valle de Alcudia en la Mancha suroccidental (Ciudad Real). Hasta la época actual mucho ganado de la mitad oriental de la Meseta utiliza el Valle de la Alcudia como pasto de invierno o como paso natural en su camino hacia los pastos de invierno de la Cuenca del Guadquivir. La zona de Almadén, situada justo al lado de este camino, es el yacimiento más rico de mercurio ( $Hg$ ), a escala mundial. Aquí el mercurio, en forma de cinabrio ( $HgS$ ), llega hasta la superficie. Es de suponer que el ganado, pasteando alrededor de los yacimientos, se comía con la hierba cierta cantidad de mercurio, asimilándolo a sus huesos. La prueba del metal en los restos de estos animales les diferenciaría de otros, que nunca pastaban por allí.

Así, la concentración de mercurio en huesos de un animal muerto podría ser un medio de detectar los movimientos que recorrió durante su vida.

### **El método: procedencia y tratamiento de las muestras de hueso**

De todos modos, la concentración del mercurio en los huesos del ganado que a lo largo de su vida pasteaba cerca de las minas de mercurio es muy baja. Por eso desarrollamos un método analítico de muy alta precisión (véase parte 2).

Por otro lado, la probabilidad de encontrar huesos de animales que han pasteado cerca de Almadén y han sido sacrificados fuera de esta zona, es baja. Por lo tanto hay que analizar un gran número de huesos de diferentes procedencias para detectar posibles diferencias en su contenido de mercurio.

Después hubo que establecer el “valor normal” de  $Hg$  como base de comparación. Analizamos 9 muestras de hueso recientes, procedentes de Almadén, consistentes tanto en huesos de matanza reciente de ganado local, comprados en una carnicería de Almadén, como en ejemplares recogidos del campo. Dada la ausencia de excavaciones arqueológicas en esta zona todavía no hemos podido analizar huesos pre y protohistóricos de Almadén.

La procedencia de los huesos prehistóricos analizados está marcada en el mapa. Proceden de varias excavaciones fuera de la zona mercurífera. En lo posible, los huesos fueron entregados al laboratorio sin limpieza previa para evitar contaminaciones indeseables.

Todavía no tenemos un número suficiente de análisis para obtener conclusiones definitivas. El propósito de este trabajo es presentar y dicutir un método nuevo que podría contribuir a resolver uno de los problemas más atractivos de la prehistoria peninsular.

mercury was recognized as a poisonous substance. PLINIUS said: "venenum rerum omnium est" (quoted by GMELIN). Mercury and its salts are considered as industrial health hazards and reports of poisonings are numerous.

Mercury is found in all tissues of animals in very low concentrations. The biological half-life of mercury in man or animals depends on its binding form (elemental mercury ( $Hg^0$ ), inorganic mercury ( $Hg^+$ ,  $Hg^{2+}$ ), and organic mercury ( $CH_3Hg^+$ )) and on the route of ingestion. Studies on a small number of volunteers have shown that the elimination of mercury, after a single exposure to metallic mercury vapor, followed a single exponential process with an average half-life of 58 days during the first few months after the exposure (WHO). The human biological half-life of mercuric mercury absorbed from the ingested dose was 29-41 days in female and 32-60 days in male volunteers (MAGOS). BASELT et al. mention human biological half-life of 24 days for inorganic mercury and 52 days for methylmercury. Mercury in all forms is a protoplasmic poison, and in higher concentrations it is lethal to all species (VENUGOPAL et al.). Because of tissue retention mercury is classified as a cumulative poison. There are no indications for the existence of a homeostatic mechanism for mercury (VENUGOPAL et al.).

The biochemistry, physiology and toxicity of mercury is extensively reviewed. There is plenty of literature about the analysis of mercury in soils and water samples, in plants, food, human and animal body fluids (reviews e.g. BASELT et al. 1989, DAUNDERER 1990/1992, ELLENHORN and BARCELOUX 1988, GMELIN 1960 ff, GREENWOOD 1984, MAGOS 1988, SUZUKI et al. 1991, VENUGOPAL et al. 1978, WHO 1991). Yet only few studies deal with the analysis of mercury in bone samples (CARRILLO et al. 1986, COCKBURN et al. 1975, LINDH et al. 1980, MALISSA et al. 1978, STOCK 1940).

The aim of our study was to ascertain mercury levels of bones of sheep/goats and cattle found in distinct areas of the Iberian Peninsula partly contaminated with relatively high natural mercury concentrations (e.g. Almadén region). We analyzed fresh bones from the butcher (table 2) as well as prehistoric bones found in various archaeological excavations (table 1).

## Materials and Methods

Bone samples of about 0,5 g (wet digestion in closed system) or about 2 g (wet digestion in open system) were dried at room temperature, weighed and digested either in a closed system: in a PTFE pressure bomb 240 - 300 min. at 150°C with 10 ml of a 1:1 mixture of nitric acid 65% / fluoric acid 40% or in a quasi open system by refluxing 240-300 min. with 20 ml of a 1:1 mixture of

of mercury. Since the mercury levels we measured in prehistoric animal bones did not exceed normal range, we have no real evidence up to now for the theory that mercury bone content is a guide element for proving transhumance on the Iberian Peninsula.

However, the highest Hg-levels were found in bone samples, excavated in the province of Ciudad Real, quite nearby the Almadén region (*Cerro de la Encantada; Motilla de Santa María del Retamar*). Further studies with bones from this region have to be made to verify this theory.

### **Discusión (español)**

Contenido de mercurio en huesos; datos publicados:

- 1) huesos de momias egipcias: 100 ng/g y 430 ng/g materia secca (COCKBURN et al. 1975).
- 2) huesos humanos "modernos": de 30 ng/g a 1040 ng/g, con un medio de 450 ng/g (citado por COCKBURN et al. 1975).
- 3) huesos de animales:  $457 \pm 17$  ng/g (CARILLO et al. 1986).
- 4) huesos humanos (muestras de autopsia (Berlin); accidentes, suicidio): 13 ng/g; médula: 19 ng/g (STOCK 1940).
- 5) muestras de autopsia de trabajadores que han sido expuestos a un número elevado de metales en una fábrica de fundición y refinería: de 20 ng/g a 100 ng/g. Grupo de comparación: de 40 ng/g a 96 ng/g; mediano 40 ng/g (LINDH et al. 1980).
- 6) Raíz de dientes humanos, empastados con amalgama y huesos maxilares (parcialmente en contacto con materiales de oro): de < 100 a 187000 ng/g (MALISSA et. al. 1978).
- 7) huesos humanos: medio de 450 ng/g (DAUNDERER 1990/1992).
- 8) huesos humanos: medio de 450 ng/g (KOCH 1991).


Los resultados de nuestras análisis de huesos prehistóricos y modernos de animales domésticos están presentados en los cuadros 1 y 2. Con excepción de uno, todos valores están dentro de la variación de los datos publicados (30 ng/g a 1040 ng/g, según COCKBURN et al.). No lavamos o purificamos los huesos antes del análisis. Por tanto no podemos excluir una ligera contaminación por fuentes externas de mercurio en caso de la clavija de cuerno del Cerro de la Encantada (E-79-A-662). Esto significa que los análisis hasta ahora no confirman nuestra teoría del mercurio como "elemento guía".

Sin embargo, llama la atención que las muestras con los valores de Hg más altos (*Cerro de la Encantada, Motilla de Santa María del Retamar*) proceden de

- industrially exposed workers. *Sci. Total Environ.* 16, 109-116 (1980).
- LINDH, U., BRUNE, D., NORDBERG, G., WESTER, P.O.: Levels of cadmium in bone tissue (femur) of industrially exposed workers - a reply. *Sci. Total Environ.* 20, 3-11 (1981).
- LOGEMANN, E., KRÜTZFELDT, B., KALKBRENNER, G., SCHÜLE, W.: Quecksilber in Knochen. *Zbl. Rechtsmed.* 38, 34 (1992).
- MAGOS, L.: Mercury; in: *Handbook on toxicity of inorganic compounds*. Seiler, H.G., Sigel, H., Sigel, A. (eds), chapter 35, p. 419-436, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel (1988).
- MALISSA, H., MALY, K., TILL, T.: Zur AAS-Bestimmung von Quecksilber in Zahnwurzeln und Kieferknochen. *Fres. Z. Anal. Chem.* 293, 141 - 144 (1978).
- STOCK, A.: Der Quecksilbergehalt des menschlichen Organismus. *Biochem. Z.* 304, 73-80 (1940).
- SUZUKI, T., IMURA, N., CLARKSON, T.W. (eds): *Advances in mercury toxicology*. Plenum Press, New York, London (1991).
- VENUGOPAL, B., LUCKEY, T.D.: *Metal toxicity in mammals*. vol. 2, p. 86-99, Plenum Press, New York, London (1978).
- WHO, World Health Organization: IPCS, Internat. Programme On Chemical Safety; Inorganic mercury; *Environmental health criteria* 118. World Health Organization, Geneva (1991).

Nº mapa	provincia	yacimiento	fase/fecha	sigla	hueso	animal *)	contenido (ng Hg/g)
7	Madrid	«Cueva de Pedro Fernández», Estremera	Bronce Inicial y Medio	EI-80-Pl. Ib-22-Sp. 133 EI-83-Ib-5301 EI-80-35-304 EI-83-Ib-5406  EI-83-Ib-5310	clav. cuerno pelvis mand.sup. mand.inf. diente pelvis mand.sup.	o/c o/c o/c o/c " o/c o/c	83-102-169 31-35-59-74 58-85 59-75-116 44 116 97
8	Madrid	«Arenero del Soto», Madrid	Bronce Final	65/20/B2/EX/F2 63/20/B3/N1 65/20/D4/EII/F1 65/20/C3/EV/Niv.1	falange II calcaneo húmero falange II	vaca o/c o/c o/c	31 48 44 28
9	Ciudad Real	«Cerro de la Encantada», Granátula Calatrava	Bronce Medio	E-79-A-677 E-79-A-656 E-79-A-662 E-78-A-630 E-78-A-632	mand.inf. mand.inf. clav.cuerno mand.inf. mand.inf.	o/c o/c o/c vaca o/c	194 520 1373 121 235
10	Ciudad Real	«Motilla de Santa María del Retamar», Argamasilla de Alba	Bronce Medio	MR-91-6716 MR-91-6691 MR-91-6666 MR-91-3510	mand.inf. mand.inf. mand.inf. mand.sup. diente	o/c o/c o/c o/c "	137 505-728 174 159 112
11	Murcia	«Cerro de la Campana», Yecla	Bronce, 1º tercio del 2º mil.  Bronce, 2º tercio del 2º mil.  Bronce, 3º tercio del 2º mil.	CC-83-1036 CC-83-715 CC-83-764  CC-85-2103 CC-85-1790 CC-85-2018 CC-83-880 CC-85-1916  CC-83-111	mand.inf. mand.inf. clav. cuerno  mand. sup. clav. cuerno mand.inf. mand.sup. clav. cuerno  mand.inf. mand.inf.	vaca o/c o/c  o/c o/c vaca o/c o/c  o/c o/c	28 9 25  104 9 71 125 537  15 15

\*) vaca: *bos taurus*  
o/c : oveja (*ovis aries*) o cabra (*capra hircus*)



### Las Cañadas Reales de España

Con más cañadas, y interrelacionadas entre si por cordeles y veredas (vías pecuarias menores) forman una red que cubre casi toda la Península [mapa según Saénz Ridruejo, C.; García Martín, P.; García Saiz, J. L.: Las rutas de la Mesta. Cuadernos de Cauce 2000 No. 10 (1986)].